

Anti-infectieux 1 / Antiinfektiva 1	
DCI	Repas / Mahlzeit
Acide fusidique / Fusidinsäure	
Acyclovir	
Albendazol(e)	!
Amantadin(e)	
Amoxicillin(e)	
Amoxicillin(e) + ac. clavulanique / Clavulansäure	
Amphotericin(e) B	
Artemether + lumefantrin(e)	!
Atovaquon(e)	!
Atovaquon(e) + proguanil	!
Azithromycin(e)	Susp. Ret. / Retardkaps.
Brivudin(e)	
Cefaclor	
Cefixim(e)	
Cefpodoxim(e)	!
Ceftibuten(e)	Caps. / Kaps. Susp. / Susp.
Cefuroxim(e)	Caps. / Kaps. (Susp. / Susp. = !)
Chloroquin(e)	!
Ciprofloxacin(e)	
Clarithromycin(e)	Cpr. / Tabl. (Cpr.ret./Retardtabl. = !)
Clindamycin(e)	
Cycloserin(e)	
Diéthylcarbamazin(e)	!
Doxycyclin(e)	Biphasique / Biphasischem
Ethambutol	
Famciclovir	
Flucloxacillin(e)	
Fluconazol(e)	
Fosfomycin(e)	
Hydroxy-chloroquin(e)	!
Iodoquinol	
Isoniazid(e)	

Anti-infectieux 2 / Antiinfektiva 2	
DCI	Repas / Mahlzeit
Itraconazol(e)	Caps. / Kaps. = ! Sol. / orale Lsg.
Ivermectin(e)	
Levofloxacin(e)	
Linezolid	
Mebendazol(e)	
Mefloquin(e)	!
Metronidazol(e)	
Minocyclin(e)	
Moxifloxacin(e)	
Nicosamid(e)	Croquer / Kauen
Nitrofurantoïn(e)	!
Norfloxacin(e)	
Nystatin(e)	
Ofloxacin(e)	
Ornidazol(e)	
Oseltamvir	
Paromomycin(e)	
Penicilin(e) V	
Posaconazol(e)	!
Praziquantel	!
Proguanil	
Proguanil + chloroquine	!
Protionamid(e)	
Pyrantel	
Pyrazinamid(e)	
Pyrimethamin(e)	
Pyrimethamin(e) + sulfadoxine	
Rifabutin(e)	
Rifampicin(e)	
Rifampicin(e) + isoniazid(e)	
Rifampicin(e) + isoniazid(e) + pyrazinamid(e)	
Rifampicin(e) + isoniazid(e) + pyrazinamid(e) + ethambutol	
Spiramycin(e)	
Terbinafin(e)	
Tinidazol(e)	
Trimethoprim(e)	
Valaciclovir	

Version 11.07.17

Légende / Legende :




	Peut être pris avec un repas pour diminuer les troubles gastriques / Kann während einer Mahlzeit eingenommen werden, um gastrointestinale Störungen zu vermeiden
!	Doit être pris avec un repas pour augmenter l'absorption / Muss mit einer Mahlzeit eingenommen werden, um die Absorption zu erhöhen
	A jeun : minimum 1h avant ou 2h après un repas pour augmenter l'absorption / Nüchtern: mindestens 1 Std. vor oder 2 Std. nach einer Mahlzeit, um die Absorption zu erhöhen

Anti-infectieux 3 / Antiinfektiva 3	
DCI	Repas / Mahlzeit
Valganciclovir	!
Vancomycin(e)	
Voriconazol(e)	

Traitements de l'Hépatite C / Hepatitis C-Medikamenten		
NOM	DCI	Repas / Mahlzeit
Baraclude®	Entecavir	
Copegus®	Ribavirine	!
Daklinza®	Daclastavir	
Epclusa®	Sofosbuvir + Velpatasvir	
Exviera®	Dasabuvir	!
Harvoni®	Sofosbuvir + Ledipasvir	
Hepsera®	Adéfovir	
Olysio®	Simeprevir	!
Rebetol®	Ribavirine	!
Sebivo®	Telbivudine	
Sovaldi®	Sofosbuvir	
Viekirax®	Paritaprevir + Ritonavir + Ombitasvir	!
Zeffix®	Lamivudine	
Zepatier®	Grazoprevir + Elbasvir	

Version 11.07.17

Légende / Legende :

	Peut être pris avec un repas pour diminuer les troubles gastriques / Kann während einer Mahlzeit eingenommen werden, um gastrointestinale Störungen zu vermeiden
	Doit être pris avec un repas pour augmenter l'absorption / Muss mit einer Mahlzeit eingenommen werden, um die Absorption zu erhöhen
	A jeun : minimum 1h avant ou 2h après un repas pour augmenter l'absorption / Nüchtern: mindestens 1 Std. vor oder 2 Std. nach einer Mahlzeit, um die Absorption zu erhöhen

Version 11.07.17

Antirétroviraux / Antiretrovirale		
NOM	DCI	Repas / Mahlzeit
3TC®	Lamivudin(e)	
Aptivus®	Tipranavir	
Atripla®	Efavirenz + emtricitabine + tenofovir +	Au coucher / beim Zubettgehen
Celsentri®	Maraviroc	
Combivir®	Lamivudin(e) + Zidovudin(e)	
Crixivan®	Indinavir	
Descovy®	Emtricitabine + Ténofovir	
Edurant®	Rilpivirine	!
Emtriva®	Emtricitabin(e)	
Eviplera®	Emtricitabine + Rilpivirine + Tenofovir	!
Genvoya®	Elvitégravir + Cobicistat + Emtricitabine + Ténofovir	
Intelence®	Etravirin(e)	!
Invirase®	Saquinavir	!
Isentress®	Raltegravir	
Kaletra®	Lopinavir + Ritonavir	(Sirop / Sirup =!)
Kivexa®	Abacavir + lamivudin(e)	
Norvir®	Ritonavir	!
Prezista®	Darunavir	!
Retrovir®	Zidovudin(e)	
Reyataz®	Atazanavir	!
Stocrin®	Efavirenz	(au coucher / beim Zubettgehen)

Antirétroviraux / Antiretrovirale		
NOM	DCI	Repas / Mahlzeit
Stribild®	Elvitégravir + Cobicistat + Emtricitabine + Ténofovir	
Telzir®	Fosamprenavir	Cpr. / Tabl. Susp. < 18 ans Susp. > 18 ans
Tivicay®	Dolutegravir	
Triumeq®	Lamivudine + Abacavir + Dolutegravir	
Trizivir®	Abacavir + lamivudin(e) + zidovudin(e)	
Truvada®	Emtricitabin(e) + tenofovir	
Videx EC®	Didanosin(e)	
Viramune®	Nevirapin(e)	
Viread®	Tenofovir	
Zerit®	Stavudin(e)	
Ziagen®	Abacavir	

Légende / Legende :

	Peut être pris avec un repas pour diminuer les troubles gastriques / Kann während einer Mahlzeit eingenommen werden, um gastrointestinale Störungen zu vermeiden
!	Doit être pris avec un repas pour augmenter l'absorption / Muss mit einer Mahlzeit eingenommen werden, um die Absorption zu erhöhen
	A jeun : minimum 1h avant ou 2h après un repas pour augmenter l'absorption / Nüchtern: mindestens 1 Std. vor oder 2 Std. nach einer Mahlzeit, um die Absorption zu erhöhen